




PARCOURS DE SOIN EN ANTE PARTUM




L'HAD Soins et Santé développe une **filière HAD ANTE et POST-PARTUM** pour la prise en charge de patientes ayant pour objectif le maintien à domicile. Ces prises en charge visent à **prévenir ou éviter toute hospitalisation itérative**.

Critères d'inclusion

- Stabilité clinique
- Accord de la patiente pour la prise en charge en HAD
- Patiente résidant dans le Rhône, le Nord Isère, ou les communes limitrophes de l'Ain
- Patients avec droits sociaux : ALD, CMU, AME, ...
- Si absence de droits ou droits partiels : PEC HAD si devis accepté par la patiente

Critères d'exclusion

- Patiente non observante et/ou non compliant
- Trajet domicile / maternité estimé trop long en fonction de la situation (parité, terme, pathologie, ...)
- Domicile non adapté à une PEC en HAD



Modalités de réadressage en Ante Partum

Réadressage d'une patiente dans sa maternité d'origine :

- Si une patiente a été mutée de sa maternité d'origine à une maternité de niveau supérieur pour pathologie de grossesse
- Que la maternité de niveau supérieur a prescrit une PEC en HAD
- Et que l'état de santé de la patiente et de son fœtus permet à nouveau une PEC dans la maternité d'origine

Alors, c'est à la maternité prescriptrice de l'HAD, de transférer le dossier de la patiente à la maternité d'origine, et non à l'HAD.



INDICATIONS DE PRISE EN CHARGE EN ANTE-PARTUM

Pathologie maternelle préexistante

- Lupus
- Diabète
- HTA
- Thrombophilie associée à un facteur de risque
- SAPL

Pathologie maternelle gravidique

- Hyperémèse gravidique
- Diabète gestationnel déséquilibré
- HTA gravidique modérée
- Cholestase gravidique

Facteurs de risques liés aux antécédents obstétricaux

Antécédent de mort fœtale

Facteurs de risques liés à la grossesse

- Rupture ou fissuration prématurée des membranes avant terme
- RCIU modéré 5ème -10ème p.
- Anémie justifiant l'injection de fer
- Antibiothérapie hospitalière après la phase aigüe (endométrite, pyélonéphrite, ...)

Problème médico-psycho-social associé à une indication médicale

En l'absence d'alternative de soins

- Menace d'accouchement prématuré suite à une hospitalisation
- Placenta prævia